



Preparación rectal

Preparación para tomografía de simulación.

El día anterior:

- Desayuno a las 7:00 a.m. con dieta indicada (<https://drrolandoloria.com/recomendacion/dieta-recomendada/>).
- Después del desayuno continúe sólo con dieta líquida blanda. deje de tomar alimentos sólidos al menos unas 3 o 4 horas antes de iniciar la limpieza intestinal. A partir de ese momento sólo podrá tomar "líquidos claros": agua, infusiones, caldos filtrados, café o té.
- Debe tomar abundantes líquidos claros durante la preparación. Los medicamentos para la presión, el corazón o convulsiones DEBE tomarlos en el horario habitual, mínimo 2 horas antes de su examen con un sorbo de agua.

Los medicamentos para la limpieza del intestino se toman de la siguiente forma:

1. Tomar vía oral 2 tabletas de Anara® (10 mg), 48 horas antes de la TAC de simulación.
2. Tomar vía oral 2 tabletas de Anara® (10 mg), 24 horas antes de la TAC de simulación.
3. Tomar vía oral Magic-Lax® (polietilenglicol 3350), 24 horas antes de la TAC de simulación, todo el contenido del frasco en 1 litro de agua.

Al terminar la preparación la deposición debe ser líquida y clara, si la calidad de su preparación no es adecuada el Licenciado en imágenes médicas a cargo de su tomografía de indicará sobre la situación y procederemos a reprogramar la cita. Si el resultado de su preparación rectal es exitosa, debe continuar con la dieta recomendada (<https://drrolandoloria.com/recomendacion/dieta-recomendada/>). y esperar le confirmen la fecha y hora del inicio de su tratamiento en Oncología Radioterápica.

Dr. Rolando Alberto Loria Ruiz.
Oncólogo Radioterápico.
Código profesional: MED8809.